

ทารกตายคลอด (stillbirth)

ทารกตายคลอด (stillbirth) อาจใช้แทนคำว่า dead fetus in utero (DFIU) ก็ได้ หมายถึง ทารกเมื่อคลอดแล้วไม่มีอาการแสดงของการมีชีวิต ได้แก่ ไม่มีการหายใจ ไม่มีการเต้นของหัวใจ และไม่มีการเคลื่อนไหว อาจรวมถึงทารกที่คลอดออกมาแล้วตายทันทีด้วย แบ่งเป็น

- Fetal death in utero ตายก่อนเจ็บครรภ์คลอด
- Intrapartum fetal death ตายในระยะคลอด

สาเหตุการตาย

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

1. สาเหตุจากทารกในครรภ์ ความผิดปกติทางโครโมโซม ความพิการแต่กำเนิด สาเหตุอื่นๆ เช่น คลอดก่อนกำหนด ภาวะโตช้าในครรภ์ชนิดรุนแรง ทารกบวมน้ำ การติดเชื้อในครรภ์
2. สาเหตุจากรก ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด การติดเชื้อในโพรงมดลูก ภาวะเส้นเลือดอุดตันในสายสะดือ การเกาะของสายสะดือที่ผิดปกติ สายสะดือผิดปกติ
3. สาเหตุจากมารดา อายุมากกว่า 35 ปี โรคทางอายุรกรรม โรคติดเชื้อต่างๆ ภาวะทางสูติกรรม เช่น คลอดก่อนกำหนด ปัญหาระหว่างรอคลอด fetal distress การคลอดติดขัด เสียเลือดมากก่อนคลอดหรือระหว่างคลอด มดลูกแตก รกลอกตัวก่อนกำหนด ตั้งครรภ์เลยกำหนด เป็นต้น ภาวะอื่นๆ เช่น ยาหรือสารเสพติด บุหรี่ เป็นต้น

การวินิจฉัย

อาการและอาการแสดง

1. ประวัติ เด็กไม่ดิ้น น้ำหนักลด เต้านมขนาดเล็กลง มีเลือดหรือน้ำออกทางช่องคลอด
2. การตรวจร่างกาย ฟังไม่ได้ยินเสียงหัวใจทารก คลำการเคลื่อนไหวของทารกไม่ได้

การตรวจค้นเพิ่มเติมและการวินิจฉัย

1. การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
2. การถ่ายภาพรังสีบริเวณท้องของมารดา ซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยได้ใช้ในการวินิจฉัยแล้ว
3. เทคนิคอื่น ๆ ตรวจหา FHS ไม่ได้จากการติด fetal monitoring ระดับของ Amniotic fluid creatine kinase ที่สูงผิดปกติ

ภาวะแทรกซ้อน

- ภาวะทางจิตใจผิดปกติ มีความรู้สึกสูญเสีย หมดกำลังใจ อาจกลายเป็นโรคจิตประสาท
- ความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือด : ถ้าทารกตายในครรภ์นานก็จะเกิดปัญหาความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือดได้ (consumptive coagulopathy) หรือ Disseminated intravascular coagulation(DIC) ซึ่งพบประมาณร้อยละ 25 ของผู้ป่วยที่ทารกตายในครรภ์หลัง 1 เดือนไปแล้ว (missed abortion หรือ retained dead fetus in utero)
- ทารกอาจแข็งกลายเป็นหิน (Lithopedian) ไม่คลอด โพรงมดลูกเสียหาย ตั้งครรภ์ต่อไม่ได้
- เพิ่มอัตราการในการยุติการตั้งครรภ์ในบางกรณีที่ตายค้างอยู่นานและติดเหนียวแน่นในโพรงมดลูก